



Bihevioralno –  
kognitivni  
**tretman**  
opsesivno –  
kompulzivnog  
poremećaja



Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije



ŠTO

JE

OKP?

**DSM-5**

*Opsesivno-kompulzivni i  
srodni poremećaji*

(OKP, tjelesni dizmorfní poremećaj,  
nakupljajući poremećaj, trihotilomanija,  
ekskorijacijski poremećaj itd.)

opetovana ponašanja ili mentalne  
aktivnosti za koje osoba osjeća da  
ih mora izvesti kao reakciju na  
neku opsesiju

nametljive, neželjene, ponavljajuće i  
ustrajne misli, predodžbe ili porivi  
koji kod većine osoba uzrokuju  
značajnu anksioznost ili patnju

# NAJČEŠĆI SADRŽAJ OPSESIJA I KOMPULZIJA

## Opesije

priljavština i bolesti

red i simetrija

antisocijalna ili nemoralna ponašanja  
(agresivna, seksualna, blasfemična itd.)

besmislice (besmislene riječi, fraze,  
melodije itd.)

## Kompulzije

pranje i čišćenje

provjeravanje

ponavljanje ponašanja ili misli

“dobre misli”

ruminacije (prežvakavanje nečega u  
mislima kako bismo u vezi toga bili  
potpuno sigurni)

# KOLIKA JE UČESTALOST OKP-a?

- cjeloživotna prevalencija oko 2%
- spol:
  - u odrasloj dobi nešto više Ž, u dječjoj dobi nešto više M
- dob:
  - prosječna dob početka: 19.5 godina
  - kod 25% počne do 14. godine
  - početak iza 40. godine neuobičajen (<5%)
- tijek:
  - ako se ne liječi, najčešće kroničnog tijeka
  - stres pogoršava simptome
- komorbiditet:
  - čest s anksioznim poremećajima (76%), depresijom (41%), opsesivno-kompulzivnim poremećajem ličnosti (23-32%), poremećajem s tikom (30%)

# Jeste li nekada pomislili...

- ...jeste li zaključali vrata/ugasili svjetlo/istaknuli znak opasnosti/...?

- ...da su posvjetili...

- ...da su se nasmijali/...?

- ...da su se nasmijali protiv njegove volje/na neprimjeren način/...?

- ...što da ubodete nekoga nožem?

**A ZAŠTO NEMATE OKP?**




# OBJAŠNENJA OKP-a (1)

- **biološki čimbenici**

- genetika (češći kod rođaka u prvom koljenu)
- disfunkcija orbitofrontalnog korteksa, korteksa prednjeg cinguluma, strijatuma itd.

- **evolucijska objašnjenja**

- osjetljivost na određene podražaje i stanja u našoj evolucijskoj povijesti bila je korisna za preživljavanje i produžetak vrste



# OBJAŠNJENJA OKP-a (2)

- **biheviornalne teorije**

- uparivanje prisilnih misli i osjećaja anksioznosti – misao postaje okidač za anksioznost (klasično uvjetovanje)
- strategije:
  - supresija misli
  - neutralizacija
  - izbjegavanje situacija koje bi mogle izazvati opsesivne misli
- ove strategije dovode do privremenog olakšanja, tj. pozitivno su potkrepljene, što održava poremećaj (operantno uvjetovanje)

# OBJAŠNJENJA OKP-a (3)

- **kognitivna objašnjenja**

- gotovo svi ljudi imaju intruzivne misli – razlika između zdravih osoba i osoba s OKP-om je u evaluaciji tih misli!
- opsesije obično povezane s područjima života u kojima osoba ima vrlo visoke standarde (npr. blasfemične misli mnogo češće kod vrlo religioznih osoba)
- pretjerana vjerovanja o opasnosti i odgovornosti i (precjenjuju vjerojatnost negativnih događaja, štetu kojom bi mogli rezultirati, stupanj vlastite odgovornosti za događaj i posljedice vlastite odgovornosti)
- fuzija misli i ponašanja – vjerovanje da su misli i ponašanja jedno te isto (pomisliti nešto nemoralno je isto kao i to zaista učiniti; razmišljanje o nečemu povećava vjerojatnost da će se to doista i dogoditi)

# PROCJENA OKP-a

- intervju
- samomotrenje
- upitnici
- opažanje *in vivo*
- **detaljno istražiti!**
  - trigere
  - intruzivne misli
  - interpretacije intruzija i posljedice intruzija kojih se boji
  - neutralizacije (motorički i mentalni rituali, traženje razuvjeravanja, potiskivanje misli, izbjegavanja itd.)

# POTEŠKOĆE U PROCJENI

## Problem

## Sugestija

neizvještavanje o svim aspektima problema



opažanje u živo i samomotrenje

odbijanje otkrivanja (zbog osjećaja srama, krivnje, straha da je lud itd.)



pažljivo, nježno propitivanje razloga, navođenje primjera

nemogućnost pronalaženja opsesije



izlaganje kao eksperiment



# Tretman


**Opsesivno-  
Kompulzivnog  
Poremećaja**

# JE LI KBT DOVOLJNO UČINKOVITA?

- prvi učinkovit tretman – izlaganje i prevencija odgovora (Victor Meyer, 1966)
- dokazano:
  - poboljšanje kod 2/3 pacijenata s ponašajnim ritualima
  - poboljšanje u raspoloženju i funkcioniranju
  - promjene se održavaju tijekom praćenja (do 4 godine)
- **ALI!**
  - mnogim pacijentima **ostaju značajni problemi** (samo 30% se značajno oporavlja, a kod 20% nema poboljšanja)
  - često **odustajanje** od tretmana (30%)
  - **dugotrajna** terapija (40-50 seansi)
- varijacije tretmana:
  - učinkovitija stroga prevencija odgovora
  - nešto učinkovitije izlaganje koje vodi terapeut
  - nema razlike između postupnog izlaganja i preplavlivanja (ali postupno je prihvatljivije za većinu pacijenata)
  - nema jasnih dokaza pomaže li modeliranje od strane terapeuta, ali se klinički često pokazuje korisnim
  - manje iskusni terapeuti jednako učinkoviti kao i iskusni ako slijede priručnik
- kognitivne tehnike manje istražene i zasad se čine podjednako učinkovitima kao i bihevioralne

# Izlaganje i prevencija odgovora

- vrlo učinkovita tehnika za kompulzije koje uključuju čišćenje i provjeravanje
- teže primjenjiva kod zaokupljenosti redom i simetrijom



## Koraci u primjeni tehnike izlaganja i prevencije odgovora

1. izraditi listu opsesija i uz svaku navesti stupanj anksioznosti koju izaziva (0-10)
2. izraditi listu kompulzija i uz svaku navesti stupanj anksioznosti koju bi klijent osjećao kada je ne bi napravio (0-10)
3. izraditi listu situacija koje izazivaju anksioznost i/ili se izbjegavaju i uz svaku navesti stupanj anksioznosti (0-10)
4. izložiti se situaciji koja će izazvati anksioznost od 3-4 i ne napraviti kompulziju
5. procijentati anksioznost na početku izlaganja te za 5, 10, 30 i 60 minuta


| Datum i vrijeme | Zadatak za izlaganje i prevenciju odgovora | Anksioznost na početku izlaganja | Anksioznost nakon 5 min | Anksioznost nakon 10 min | Anksioznost nakon 30 min | Anksioznost nakon 60 min |
|-----------------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                 |  |                                  |                         |                          |                          |                          |

**VAŽNO!**

- izlaganje treba biti "pretjerano"
- tijekom izlaganja terapeut mora **izbjegavati razuvjeravanja**
- osigurati da se rituali **ne izvode** nakon izlaganja

# Trening relaksacije

- abdominalno disanje i progresivna mišićna relaksacija
- **NE** izvoditi tijekom izlaganja!



# Kognitivne tehnike (1)

- **normaliziranje** opsesivnih misli
- **edukacija o zakonima vjerojatnosti** (literatura, računanje vjerojatnosti određenih događaja)
- **izlaganje opsesijama** (namjerno ih misliti/preslušavati 10-30 minuta dnevno, bez neutralizirajućih misli)

# Kognitivne tehnike (2)

- **bihevioralni eksperimenti**

- pogodni za rad na fuziji misli i ponašanja
- klijenta najprije podučiti da osobe s OKP-om OPSESIJE NIKAD NE PROVEDU U DJELO!
- primjeri eksperimenata:
  - *“Ako nešto pomisliš, veća je šansa da će se to dogoditi”*
    - otići do prozora i misliti kako će se zgrada preko puta srušiti – je li se urušila?
  - *“Loša sam osoba ako imam takve misli”*
    - zamišljati kako bolesnoj susjedi nešto treba iz trgovine pa joj odlazimo to kupiti – čini li nas to zamišljanje dobrom osobom?

# Kognitivne tehnike (3)

- **kognitivna restrukturacija**

- pogodna za rad na metakognicijama o odgovornosti (npr. *“Ako imam takvu misao, to znači da sam loša osoba”, “Bit ću loša osoba ako ne učinim sve da spriječim neko zlo”*)
- prepoznavanje, vrednovanje i odgovaranje na metakognicije (npr. kroz dnevnik misli)

| Datum i vrijeme | Misao | Značenje misli | Odgovor na misao* |
|-----------------|-------|----------------|-------------------|
|                 |       |                |                   |

\*Pitanja koja pomažu u pronalaženju odgovora:

1. Koje dokaze imam za tu misao?
2. Postoje li neki dokazi protiv nje?
3. Bi li ti dokazi bili prihvaćeni na sudu?
4. Što bih rekao prijatelju da razmišlja na ovakav način?
5. Što bi prijatelj rekao meni da mu sada to kažem?
6. Koje su posljedice mog razmišljanja?
7. Kako mogu testirati ovu misao?

# Kognitivne tehnike (4)

- **pita tehnika**

- npr. napraviti popis svih osoba i čimbenika koji bi, osim klijenta, mogli biti uključeni u anticipirani negativni događaj i navesti udio odgovornosti svakoga od njih



# Kognitivne tehnike (5)

- **metoda četiri koraka**


1. preimenovanje
2. pripisivanje
3. preusmjeravanje pozornosti
4. ponovna procjena

Misao da ću sada.... je samo opsesija, a poriv da sada napravim.... je samo kompulzija za koju moj mozak misli da će smanjiti moju uznemirenost.

To nisam ja, to je samo moj OCD – neurobiološki poremećaj.

Sada ću primijeniti pravilo 15 minuta. Barem 15 minuta ću se truditi fokusirati pažnju na.... Svakih 5 minuta ću provjeravati koliko je jaka moja potreba za kompulzijom i vjerojatno ću vidjeti da ona ne traje dugo. Vidjet ću i da se neće dogoditi ništa ako ne napravim kompulziju.

Znam što je realitet. To što mi se događa je samo moj svojehlavi OCD mozak. Znam kako ću se suočiti ako se ovakvi porivi ponove – koristit ću ono što sam naučio na terapiji.



# Prevenција povrata simptoma

- pomoći klijentu **predvidjeti izvore stresa** koji bi mogli vratiti simptome
  - privremeni povratak nekih simptoma normalan – prilika za uvježbavanje naučenih vještina
  - naučiti ga kako se nositi sa stresorima, kako ispuniti slobodno vrijeme, rješavati konflikte i sl.
- pomoći mu u popisivanju **koraka koje treba slijediti u slučaju povrata simptoma** (uključujući samostalno vođeno izlaganje, kognitivnu restrukturaciju, “booster” seansu s terapeutom i sl.)

# OGRANIČENJA KBT-a ZA OKP

- dugotrajnost (često zahtijeva 30-40 seansi)
- odustajanje (30% odbija izlaganje)
- rezidualni simptomi (poboljšanje kod većine pacijenata, ali ostanu neki simptomi)
- “pure obsessions” (zaustavljanje misli relativno neučinkovito; čini se da nema efikasne tehnike)





**Hvala  
na  
pažnji!**